

Informationsblatt zum
BEHANDLUNGSENDE



LIEBE PATIENTIN, LIEBER PATIENT,

heute haben wir die Kieferorthopädische Behandlung beendet.

Jedoch finden **lebenslang Veränderungen** der Schädelknochen durch natürliche Umbauvorgänge statt. Zwischen dem 18. und 25. Lebensjahr kann es zu einem Restwachstumsschub des Unterkiefers kommen.

Je größer die Zahnkorrekturen waren, umso stärker neigen die Zähne dazu sich in die alte Position zu bewegen.

Eine gewissenhafte Kontrolle ist notwendig, um ein schönes Lächeln zu behalten.

Die herausnehmbaren Zahnsparren sollten **ein Leben lang** und in regelmäßigen Abständen als **Kontrollgerät** genutzt werden. Das heißt:

- **Einmal im Monat** selbständig einsetzen und kontrollieren.
- Sitzt die Spange **spannungsfrei**, kann sie direkt wieder ausgezogen werden.
- Ist eine **Spannung vorhanden** sollte die Zahnsparre, bis sie wieder spannungsfrei ist, jede Nacht getragen werden.
- Sollte die Zahnsparre nach einer Woche nicht spannungsfrei sein, bitte einen Termin in unserer Praxis vereinbaren.
- Löst sich der **Langzeitretainer**, sollte die herausnehmbare Zahnsparre täglich mindestens 16 Stunden getragen werden, um die Position der Zähne zu halten.
- Des weiteren sollte so schnell wie möglich ein Termin in unserer Praxis vereinbart werden.

Der Langzeitretainer ist für die **Stabilität** des Behandlungsergebnisses notwendig. Um erneute Zahnfehlstellungen zu vermeiden sollte der Langzeitretainer, nach unserer Empfehlung, **ein Leben lang** im Mund verbleiben. Er kann jedoch auf Wunsch des Patienten entfernt werden.

Wir bieten ab dem Einsetzen des Langzeitretainers eine **Garantie von 2 Jahren**. Danach berechnen wir das Kleben eines neuen Retainers oder die Reparatur einer Klebestelle.

DIE KOSTEN BEI EINEM LANGZEITRETAINER BETRAGEN:

- Neuen Retainer kleben: 300 € (pro Kiefer)
- Klebestelle erneuern: 20 € (pro Zahn)
- Retainer entfernen: 50 € (pro Kiefer)

WICHTIG:

Wenn sich der Langzeitretainer löst, sollte die herausnehmbare Zahnsparre täglich mindestens 16 Stunden getragen werden um die Position der Zähne zu halten, und ein Termin in unserer Praxis vereinbart werden.



Dreh- und Engstände benötigen eine Langzeit Retention.



Ein Langzeitretainer stabilisiert die Zähne nach umfangreichen Zahnbewegungen.